



UTEKOČINJENA



Uporaba stopnje 3 (utekočinjena hrana) za odrasle

Kakšna je stopnja gostote?

Stopnja 3 (utekočinjena):


- ✓ Lahko se je z žlico ali pije iz skodelice.
- ✓ **Ni je mogoče** jesti z vilicami, saj kaplja skozi zareze vilic.
- ✓ Imata gladko teksturo brez koščkov (grudic, vlaken, luščine, lupine, kože, hrustanca, kosti).

Zakaj se ta stopnja gostote uporablja za odrasle?

Stopnja 3 (utekočinjena) se lahko uporablja, če imate težave s premikanjem jezika. Gostejska konsistenza omogoča jeziku, da utekočinjeno hrano dlje časa zadrži in lažje premika po ustih. Utekočinjeno hrano je najlažje jesti z žlico. Ob uživanju tovrstne tekture hrane se posvetujte z dietetikom, ki bo glede na vaše potrebe preveril, ali zaužijete ustrezeno količino hrani.

Stopnja 4: Uporabite test kapljivanja z vilic/nagibanja žlice IDDSI

Test pretočnosti IDDSI



Kako preverim, ali hrana ustreza stopnji 3 (utekočinjena)?

Gostoto utekočinjene hrane je najbolj zanesljivo izmeriti s testom pretočnosti IDDSI **in** testom kapljivanja z vilic IDDSI. Testa izmerita gostoto tekočine glede na to, koliko tekočine izteče iz 10 ml brizge v 10 sekundah in kako hitro tekočina pronica skozi zareze jedilnih vilic.

IDDSI priporoča, da za preverjanje ustrezne stopnje gostote uporabite 10 ml brizgo in sledite spodaj podanim navodilom. Pri hrani, ki ustreza stopnji 3 (utekočinjena), mora biti po 10 sekundah pretoka v brizgi **najmanj 8 ml ostanka**. Strokovnjak lahko poda določeno število med 8 in 10 ml, ki ga je potrebno doseči. Pri uporabi testa kapljivanja z vilic IDDSI snov počasi pronica skozi zareze vilic.

Oglejte si videoposnetke testa pretočnosti IDDSI in testa kapljivanja z vilic IDDSI na
www.IDDSI.org/framework/drink-testing-methods/

Pred testiranjem ...

Preverite
dolžino brizge,
saj se le-te
med seboj
razlikujejo.
Vaša brizga
mora izgledati
tako:



Dolžina 10 ml skale
= 61,5 mm



Test kapljivanja z vilic IDDSI

Snov počasi pronica skozi
zareze vilic.

1. Odstranite bat.

2. S prstom pokrijte
ustje brizge in jo
napolnite z 10 ml.

3. Umaknite prst z ustja
in začnite meriti čas.

4. Ustavite po 10 sekundah.

TEST PRETOČNOSTI IDDSI